

Экзамен по допуску лиц, не завершивших освоение основных образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием, к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала

Образцы тестовых заданий

1. ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ ИГЛЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ:

- 1) В зависимости от расположения сосуда
- 2) Две трети иглы
- 3) На всю длину иглы
- 4) Только срез иглы

Ответ 4.

2. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ –ЭТО

- 1) Кома
- 2) Обморок
- 3) Сопор
- 4) Коллапс

Ответ 2.

3. ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ КАТЕТЕР НЕОБХОДИМО

- 1) Промыть в проточной воде
- 2) Положить в 0,02% раствор фурацилина, T = 37°C на 1 час
- 3) Положить в 3% хлорамина на 1 час
- 4) Провести предстерилизационную очистку

Ответ 3.

4. ЛЕКАРСТВА, РАЗДРАЖАЮЩИЕ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ

- 1) До еды
- 2) Во время еды
- 3) После еды, запивая молоком или водой
- 4) Между приемами пищи

Ответ 3.

5. НЕОБРАТИМЫМ ЭТАПОМ УМИРАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) Клиническая смерть
- 2) Агония
- 3) Преагония
- 4) Биологическая смерть

Ответ 4.

6. СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСКИ ПРОЦЕДУРНОЙ СЕСТРОЙ СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 6

Ответ 2.